

APPENDIX 1. The Terminology in Provisions by Therapeutic Classification

Number	Therapeutic Classification	Terminology in Provisions
316, 473, 590, 692	Vomiting Therapy	316. 太陽病 三日 已發汗 若吐 若下 若溫針 仍不解者 此為壞病 桂枝湯不可與也。觀其脈證 知犯何逆 隨證治之。 [017]傷寒(宋16)
		473. 病如桂枝證 頭不痛 項不強 寸脈微浮 胸中痞鞅 氣上咽喉 不得息者 此為胸有寒也 當吐之 宜瓜蒂散。 [174]傷寒
		590. 宿食在上脘者 法當吐之 宜瓜蒂散。 [291]傷寒
		692. 病人手足厥冷 脈乍緊者 邪結在胸中 心下滿而煩 飢不能食者 病在胸中 當須吐之 宜瓜蒂散。 [393]傷寒
467, 485	Urinating Therapy	467. 傷寒 服湯藥下之 利不止 心下痞鞅 服瀉心湯不已 復以他藥下之 利益甚 醫以理中與之 利仍不止 理中者 理中焦 此利在下焦故也 赤石脂禹餘糧湯主之 復不止者 當利其小便。 [168]傷寒
		485. 問曰 何緣得陽明病? 答曰 太陽病 若發汗 若下 若利小便 此亡津液 胃中乾燥 因轉屬陽明 不更衣 內實 大便難者 此名陽明也。 [186]傷寒(宋181)
372, 556	Harmonizing Therapy	372. 發汗後 惡寒者 虛故也 不惡寒 但熱者 實也 當和胃氣 與調胃承氣湯。 (方見上卷) [073]傷寒(宋70)
		556. 太陽病 若吐 若下 若發汗後 微煩 小便數 大便因鞅者 與小承氣湯和之愈。 [257]傷寒
330, 605, 641, 710	Warming Therapy	330. 問曰 太陽病 其證備 按桂枝法治之 而增劇 厥逆 咽中乾 煩躁 吐逆 譏語 其故何也? 師曰 此陽旦證 不可攻也 寸口脈浮 浮為風 亦為虛 風則生熱 虛則攣急 誤攻其表 則汗出亡陽 汗多則液枯 液枯則筋攣 陽明內結則煩躁譏語 用甘草乾薑以復其陽 芍藥甘草以救液 調胃承氣以止其譏語 此壞病之治 必隨脈證也。 [031]傷寒(宋30)
		605. 自利不渴者 屬太陰 以其臟有寒故也 當溫之 宜服理中 四逆輩。 [306]傷寒(宋277)
		641. 少陰病 得之一二日 口中和 其背惡寒者 當灸之 附子湯主之。 [342]傷寒(宋304)
		710. 下利 腹脹滿 身體疼痛者 先溫其裏 乃攻其表 溫裏宜四逆湯, 攻表宜桂枝湯。 (四逆湯方見前) [411]傷寒
330, 575, 816, 213	Strengthening Therapy	330. 問曰 太陽病 其證備 按桂枝法治之 而增劇 厥逆 咽中乾 煩躁 吐逆 譏語 其故何也? 師曰 此陽旦證 不可攻也 寸口脈浮 浮為風 亦為虛 風則生熱 虛則攣急 誤攻其表 則汗出亡陽 汗多則液枯 液枯則筋攣 陽明內結則煩躁譏語 用甘草乾薑以復其陽 芍藥甘草以救液 調胃承氣以止其譏語 此壞病之治 必隨脈證也。 [031]傷寒(宋30)
		575. 諸黃 小便自利者 當以虛勞法 小建中湯主之。 [276]傷寒
		213. 問曰 上工治未病 何也? 師曰 夫治未病者 見肝之病 知肝傳脾 當先實脾 四季脾旺不受邪 即勿補之 中工不曉相傳 見肝之病 不解實脾 惟治肝也 夫肝之病 補用酸 助用焦苦 益用甘味之藥調之 酸入肝 焦苦入心 甘入脾 脾能傷腎 腎氣微弱 則水不行 水不行 則心火氣盛 心火氣盛則傷肺 肺被傷 則金氣不行 金氣不行 則肝氣盛 肝必自愈 此治肝補脾之要妙也 肝虛則用此法 實則不可用之 經曰 勿虛虛 勿實實 補不足 損有餘 是其義也 餘臟准此。 [01]雜病例
		816. 五勞虛極 羸瘦 腹滿 不能飲食 食傷 憂傷 飲傷 房室傷 飢傷 勞傷 經絡榮衛氣傷 內有乾血 肌膚甲錯 兩目黯黑 緩中補虛 大黃蠅蟲丸主之。 [15]血痺虛勞
317, 471, 485, 540, 574, 759	Sweating Therapy	317. 桂枝湯本為解肌 若其人脈浮緊 發熱 汗不出者 不可與也 常須識此 勿令誤也 若酒客病 亦不可與桂枝湯 得之必嘔 以酒客不喜甘故也。 [018]傷寒
		471. 傷寒 大下後 復發汗 心下痞 惡寒者 表未解也 不可攻痞 當先解表 後攻其痞 解表宜桂枝湯 攻痞宜大黃黃連黃芩瀉心湯。 [172]傷寒
		485. 問曰 何緣得陽明病? 答曰 太陽病 若發汗 若下 若利小便 此亡津液 胃中乾燥 因轉屬陽明 不更衣 內實 大便難者 此名陽明也。 [186]傷寒(宋181)
		540. 陽明病 脈遲 汗出多 微惡寒者 表未解也 可發汗 宜桂枝湯。 [241]傷寒(宋234)
		574. 諸黃家 但利其小便 五苓散加茵陳蒿主之; 假令脈浮 當以汗解者 宜桂枝加黃耆湯。 (五苓散見前加茵陳蒿十分同末) [275]傷寒
759. 吐利止 而身痛不休者 當消息和 解其外 宜桂枝湯。 [19]霍亂		
671	Cooling Therapy	671. 傷寒六七日 脈遲 而反與黃芩湯 撤其熱 脈遲為寒 今與黃芩湯復除其熱 腹中應冷 今反能食 此名除中 必死。 [372]傷寒
316, 558	Defecating Therapy	316. 太陽病 三日 已發汗 若吐 若下 若溫針 仍不解者 此為壞病 桂枝湯不可與也 觀其脈證 知犯何逆 隨證治之。 [017]傷寒(宋16)
		558. 傷寒六七日 目中不了了 睛不和 無表裏證 大便難 身微熱者 此為實也 急下之 宜大承氣湯。 [259]傷寒

Number	Therapeutic Classification	Terminology in Provisions
228, 409, 499, 513, 710,	Sweating/Cooling/ Defecating Therapy	<p>228. 夫病在諸臟 欲攻 當隨其所得而攻之。如渴者 與豬苓湯。餘仿此。 [16]雜病例</p> <p>409. 太陽病不解 熱結膀胱 其人如狂 血自下 下者愈。其外不解者 尚末可攻 當先解外。外解已 但少腹急結者 乃可攻之 宜桃核承氣湯。 [110]傷寒</p> <p>499. 陽明病 不能食 攻其熱必噦 所以然者 其人本虛 胃中冷故也。 [200]傷寒(宋194).</p> <p>513. 陽明病 脈實 雖汗出 而不惡熱者 其身必重 短氣 腹滿而喘 有潮熱者 此外欲解 可攻裏也 手足濇然汗出者 此大便已鞕也 大承氣湯主之。若汗多 微發熱惡寒者 外未解也。其熱不潮者 未可與承氣湯。若腹大滿不通者 可與小承氣湯 微和胃氣 勿令大泄下。 [214]傷寒</p> <p>710. 下利 腹脹滿 身體疼痛者 先溫其裏 乃攻其表 溫裏宜四逆湯 攻表宜桂枝湯。 [411]傷寒(宋372)(金匱326).</p>

## APPENDIX 2. The Confirmed Prescriptions by Therapeutic Classification

Therapeutic Classification	Prescription (Reference Number)	Provisions
Vomiting Therapy	瓜蒂散 (473, 590, 692)	<p>473. 病如桂枝證 頭不痛 項不强 寸脈微浮 胸中痞鞭 氣上咽喉 不得息者 此為胸有寒也 當吐之 宜瓜蒂散。 [174]傷寒</p> <p>590. 宿食在上脘者 法當吐之 宜瓜蒂散。 [291]傷寒</p> <p>692. 病人手足厥冷 脈乍緊者 邪結在胸中 心下滿而煩 飢不能食者 病在胸中 當須吐之 宜瓜蒂散。 [393]傷寒</p>
Urinating Therapy	腎氣丸(960)	<p>960. 問曰 婦人病 飲食如故 煩熱不得臥 而反倚息者 何也? 師曰 此名轉胞 不得溺也。以胞系了戾 故致此病 但利小便則愈 腎氣丸主之。 [36]婦人</p>
Harmonizing Therapy	<p>調胃承氣湯(329, 372)</p> <p>小承氣湯(513, 514, 556, 557)</p> <p>小柴胡湯(536)</p> <p>枳實芍藥散(940)</p>	<p>329. 傷寒 脈浮 自汗出 小便數 心煩 微惡寒 腳攣急 反與桂枝湯欲攻其表 此誤也。得之便厥 咽中乾 煩躁 吐逆者 作甘草乾薑湯與之 以復其陽。若厥愈 足溫者 更作芍藥甘草湯與之 其脚即伸。若胃氣不和 譫語者 少與調胃承氣湯。若重發汗 復加燒針者 四逆湯主之。 [030]傷寒</p> <p>372. 發汗後 惡寒者 虛故也; 不惡寒 但熱者 實也。當和胃氣 與調胃承氣湯。(方見上卷) [073]傷寒</p> <p>513. 陽明病 脈實 雖汗出 而不惡熱者 其身必重 短氣 腹滿而喘 有潮熱者 此外欲解 可攻裏也 手足濇然汗出者 此大便已鞕也 大承氣湯主之; 若汗多 微發熱惡寒者 外未解也。其熱不潮者 未可與承氣湯; 若腹大滿不通者 可與小承氣湯 微和胃氣 勿令大泄下。 [214]傷寒</p> <p>514. 陽明病 潮熱 大便微鞕者 可與大承氣湯; 不鞕者不可與之。若不大便六七日 恐有燥屎 欲知之法 少與小承氣湯; 湯入腹中 轉失氣者 此有燥屎也 乃可攻之; 若不轉失氣者 此但初頭鞕 後必溏 不可攻之 攻之必脹滿 不能食也 欲飲水者 與水則噦; 其後發熱者 必大便復鞕而少也 以小承氣湯和之; 不轉失氣者 慎不可攻也。(方見前) [215]傷寒</p> <p>556. 太陽病 若吐 若下 若發汗後 微煩 小便數 大便因鞕者 與小承氣湯和之愈。(方見前) [257]傷寒</p> <p>557. 得病二三日 脈弱 無太陽柴胡證 煩躁 心下鞭 至四五日 雖能食 以小承氣湯少少與微和之 令心安。至六日與小承氣湯一升。若不大便六七日 小便少者 雖不大便 但初頭鞕 後必溏 未定成鞭 攻之必溏 須小便利 屎定鞕 乃可攻之 宜大承氣湯。(方見前) [258]傷寒</p> <p>536. 陽明病 脇下鞭滿 不大便而嘔 舌上白苔者 可與小柴胡湯 上焦得通 津液得下 胃氣因和 身濇然汗出而解也。(方見上) [237]傷寒</p> <p>940. 產後腹痛 煩滿不得臥 不可下也 宜枳實芍藥散和之。 [16]婦人</p>
Warming Therapy	<p>四逆輩(四逆湯)(605, 661, 662, 710)</p> <p>理中輩(理中湯)(580, 605, 753/782),</p> <p>理中加黃耆湯(613)</p>	<p>605. 自利不渴者 屬太陰 以其臟有寒故也。當溫之 宜服理中 四逆輩。 [306]傷寒</p> <p>661. 少陰病 脈沈者 急溫之 宜四逆湯。 [362]傷寒</p> <p>662. 少陰病 飲食入口即吐 或心中溫溫欲吐 復不能吐 始得之 手足寒 脈弦遲者 此胸中實 不可下也 當吐之; 若膈上有寒飲 乾嘔者 不可吐也 當溫之 宜四逆湯。(方見上) [363]傷寒</p> <p>710. 下利 腹脹滿 身體疼痛者 先溫其裏 乃攻其表 溫裏宜四逆湯; 攻表宜桂枝湯。(四逆湯方見前) [411]傷寒</p>