

Number	Therapeutic Classification	Terminology in Provisions
228, 409, 499, 513, 710,	Sweating/Cooling/ Defecating Therapy	<p>228. 夫病在諸臟 欲攻 當隨其所得而攻之。如渴者 與豬苓湯。餘仿此。 [16]雜病例</p> <p>409. 太陽病不解 熱結膀胱 其人如狂 血自下 下者愈。其外不解者 尙未可攻 當先解外。外解已 但少腹急結者 乃可攻之 宜桃核承氣湯。 [110]傷寒</p> <p>499. 陽明病 不能食 攻其熱必噦 所以然者 其人本虛 胃中冷故也。 [200]傷寒(宋194).</p> <p>513. 陽明病 脈實 雖汗出 而不惡熱者 其身必重 短氣 腹滿而喘 有潮熱者 此外欲解 可攻裏也 手足濇然汗出者 此大便已鞕也 大承氣湯主之。若汗多 微發熱惡寒者 外未解也。其熱不潮者 未可與承氣湯。若腹大滿不通者 可與小承氣湯 微和胃氣 勿令大泄下。 [214]傷寒</p> <p>710. 下利 腹脹滿 身體疼痛者 先溫其裏 乃攻其表 溫裏宜四逆湯 攻表宜桂枝湯。 [411]傷寒(宋372)(金匱326).</p>

APPENDIX 2. The Confirmed Prescriptions by Therapeutic Classification

Therapeutic Classification	Prescription (Reference Number)	Provisions
Vomiting Therapy	瓜蒂散 (473, 590, 692)	<p>473. 病如桂枝證 頭不痛 項不强 寸脈微浮 胸中痞鞕 氣上咽喉 不得息者 此爲胸有寒也 當吐之 宜瓜蒂散。 [174]傷寒</p> <p>590. 宿食在上脘者 法當吐之 宜瓜蒂散。 [291]傷寒</p> <p>692. 病人手足厥冷 脈乍緊者 邪結在胸中 心下滿而煩 飢不能食者 病在胸中 當須吐之 宜瓜蒂散。 [393]傷寒</p>
Urinating Therapy	腎氣丸(960)	<p>960. 問曰 婦人病 飲食如故 煩熱不得臥 而反倚息者 何也? 師曰 此名轉胞 不得溺也。以胞系了戾 故致此病 但利小便則愈 腎氣丸主之。 [36]婦人</p>
Harmonizing Therapy	<p>調胃承氣湯(329, 372)</p> <p>小承氣湯(513, 514, 556, 557)</p> <p>小柴胡湯(536)</p> <p>枳實芍藥散(940)</p>	<p>329. 傷寒 脈浮 自汗出 小便數 心煩 微惡寒 腳攣急 反與桂枝湯欲攻其表 此誤也。得之便厥 咽中乾 煩躁 吐逆者 作甘草乾薑湯與之 以復其陽。若厥愈 足溫者 更作芍藥甘草湯與之 其脚即伸。若胃氣不和 譫語者 少與調胃承氣湯。若重發汗 復加燒針者 四逆湯主之。 [030]傷寒</p> <p>372. 發汗後 惡寒者 虛故也; 不惡寒 但熱者 實也。當和胃氣 與調胃承氣湯。(方見上卷) [073]傷寒</p> <p>513. 陽明病 脈實 雖汗出 而不惡熱者 其身必重 短氣 腹滿而喘 有潮熱者 此外欲解 可攻裏也 手足濇然汗出者 此大便已鞕也 大承氣湯主之; 若汗多 微發熱惡寒者 外未解也。其熱不潮者 未可與承氣湯; 若腹大滿不通者 可與小承氣湯 微和胃氣 勿令大泄下。 [214]傷寒</p> <p>514. 陽明病 潮熱 大便微鞕者 可與大承氣湯; 不鞕者不可與之。若不大便六七日 恐有燥屎 欲知之法 少與小承氣湯; 湯入腹中 轉失氣者 此有燥屎也 乃可攻之; 若不轉失氣者 此但初頭鞕 後必溏 不可攻之 攻之必脹滿 不能食也 欲飲水者 與水則噦; 其後發熱者 必大便復鞕而少也 以小承氣湯和之; 不轉失氣者 慎不可攻也。(方見前) [215]傷寒</p> <p>556. 太陽病 若吐 若下 若發汗後 微煩 小便數 大便因鞕者 與小承氣湯和之愈。(方見前) [257]傷寒</p> <p>557. 得病二三日 脈弱 無太陽柴胡證 煩躁 心下鞕 至四五日 雖能食 以小承氣湯少少與微和之 令心安。至六日與小承氣湯一升。若不大便六七日 小便少者 雖不大便 但初頭鞕 後必溏 未定成鞕 攻之必瀉 須小便利 屎定鞕 乃可攻之 宜大承氣湯。(方見前) [258]傷寒</p> <p>536. 陽明病 脇下鞕滿 不大便而嘔 舌上白苔者 可與小柴胡湯 上焦得通 津液得下 胃氣因和 身濇然汗出而解也。(方見上) [237]傷寒</p> <p>940. 產後腹痛 煩滿不得臥 不可下也 宜枳實芍藥散和之。 [16]婦人</p>
Warming Therapy	<p>四逆輩(四逆湯)(605, 661, 662, 710)</p> <p>理中輩(理中湯)(580, 605, 753/782),</p> <p>理中加黃耆湯(613)</p>	<p>605. 自利不渴者 屬太陰 以其臟有寒故也。當溫之 宜服理中 四逆輩。 [306]傷寒</p> <p>661. 少陰病 脈沈者 急溫之 宜四逆湯。 [362]傷寒</p> <p>662. 少陰病 飲食入口即吐 或心中溫溫欲吐 復不能吐 始得之 手足寒 脈弦遲者 此胸中實 不可下也 當吐之; 若膈上有寒飲 乾嘔者 不可吐也 當溫之 宜四逆湯。(方見上) [363]傷寒</p> <p>710. 下利 腹脹滿 身體疼痛者 先溫其裏 乃攻其表 溫裏宜四逆湯; 攻表宜桂枝湯。(四逆湯方見前) [411]傷寒</p>

Therapeutic Classification	Prescription (Reference Number)	Provisions
		580. 夫病人腹痛繞臍 此為陽明風冷 穀氣不行 若反下之 其氣必衝 若不衝者 心下則痞 當溫之 宜理中湯. [281]傷寒
		605. 自利不渴者 屬太陰 以其臟有寒故也. 當溫之 宜服理中 四逆輩. [306]傷寒
		613. 太陰病 不吐 不滿 但遺矢無度者 虛故也 理中加黃耆湯主之. [314]傷寒
吳茱萸湯(579)		753. 霍亂證 有虛實 因其人本有虛實 證隨本變故也 虛者脈濡而弱 宜理中湯; 實者脈急 而促 宜葛根黃連黃芩甘草湯. [13]霍亂
		782. 大病差後 喜唾 久不了了 胸上有寒也 當以丸藥溫之 宜理中丸. (方見霍亂) [19]瘧 易差後
		579. 跌陽脈微而弦 法當腹滿 若不滿者 必大便難 兩脇疼痛 此為虛寒 當溫之 宜吳茱萸 湯. (方見前) [280]傷寒
		323. 太陽病 得之八九日 如瘧狀 發熱惡寒 熱多寒少 其人不可嘔 清便欲自可 一二三度 發. 脈微緩者 為欲愈也. 脈微而惡寒 此陰陽俱虛 不可更發汗 更吐下也. 面色反有 熱色者 未欲解也 以其不能得小汗出 身必癢 宜桂枝麻黃各半湯. [024]傷寒
		269. 濕氣在外 因風相搏 流於經絡 骨節煩疼 臥不欲食 脈浮緩 按之濡 桂枝湯微發其汗 令風濕俱去; 若惡寒 身體疼痛 四肢不仁 脈浮而細緊 此為寒氣并 桂枝麻黃各半湯 主之. [03]濕病
		317. 桂枝湯本為解肌 若其人脈浮緊 發熱 汗不出者 不可與也. 常須識此 勿令誤也. 若酒 客病 亦不可與桂枝湯 得之必嘔 以酒客不喜甘故也. [018]傷寒
		329. 傷寒 脈浮 自汗出 小便數 心煩 微惡寒 腳攣急 反與桂枝湯欲攻其表 此誤也. 得之 便厥 咽中乾 煩躁 吐逆者 作甘草乾薑湯與之 以復其陽. 若厥愈 足溫者 更作芍藥甘 草湯與之 其脚即伸. 若胃氣不和 譫語者 少與調胃承氣湯. 若重發汗 復加燒針者 四 逆湯主之. [030]傷寒
		342. 太陽病 外證未解 脈浮弱者 當以汗解 宜桂枝湯. (見上卷) [043]傷寒
		345. 太陽病 先發汗不解 而復下之 脈浮者不愈. 浮為在外 而反下之 故令不愈. 今脈浮 故知在外 當須解外則愈 宜桂枝湯. (方見上卷) [046]傷寒
桂枝麻黃各半湯(323)		353. 病人常自汗出者 此為榮氣和 衛氣不諧也 所以然者 榮行脈中 衛行脈外 衛氣不共榮 氣和諧故也. 復發其汗則愈 宜桂枝湯. (方見上卷) [054]傷寒
桂枝湯(269, 317, 329, 342, 344, 345, 353, 354, 356, 357, 395, 398, 471, 540, 546, 604, 710, 759)		354. 病人臟無他病 時發熱 自汗出而不愈者 此衛氣不也和. 先其時發汗則愈 宜桂枝湯. (方見上卷) [055]傷寒
Sweating Therapy		356. 傷寒 不大便六七日 頭痛有熱者 與承氣湯. 其小便清者 知不在裏 仍在表也 當須發 汗 宜桂枝湯. (方見上卷) [057]傷寒
麻黃湯(351, 352, 541)		357. 傷寒 發汗已解 半日許復煩 脈浮緊者 可更發汗 宜桂枝湯. (方見上卷) [058]傷寒
		395. 傷寒醫下之 續得下利 清穀不止 身疼痛者 急當救裏; 後身疼痛 清便自調者 急當救 表. 救裏宜四逆湯; 救表宜桂枝湯. (方見上卷) [096]傷寒
桂枝加黃耆湯(574)		398. 太陽病 發熱汗出者 此為榮弱衛強 故使汗出 欲救邪風者 宜桂枝湯. (方見上卷) [099]傷寒
		471. 傷寒 大下後 復發汗 心下痞 惡寒者 表未解也 不可攻痞 當先解表 後攻其痞 解表 宜桂枝湯 攻痞宜大黃黃連黃芩瀉心湯.(方見前) [172]傷寒
		540. 陽明病 脈遲 汗出多 微惡寒者 表未解也 可發汗 宜桂枝湯. [241]傷寒
		546. 病人煩熱 汗出則解 又如瘧狀 日晡所發熱者 屬陽明也. 脈實者 宜下之 脈浮大者 宜發汗. 下之與大承氣湯 發汗宜桂枝湯.(方見前) [247]傷寒
		604. 太陰病 脈浮者 可發汗 宜桂枝湯. [305]傷寒
		710. 下利 腹脹滿 身體疼痛者 先溫其裏 乃攻其表 溫裏宜四逆湯; 攻表宜桂枝湯. (四逆 湯方見前) [411]傷寒
		759. 吐利止 而身痛不休者 當消息和解其外 宜桂枝湯. [19]霍亂
		351. 脈浮者 病在表 可發汗 宜麻黃湯. (方見上) [052]傷寒
		352. 脈浮而緊者 可發汗 宜麻黃湯. (方見上) [053]傷寒
		541. 陽明病 脈浮 無汗而喘者 發汗則愈 宜麻黃湯. (方見前) [242]傷寒
		574. 諸黃家 但利其小便 五苓散加茵陳蒿主之; 假令脈浮 當以汗解者 宜桂枝加黃耆湯. (五苓散見前加茵陳蒿十分同末) [275]傷寒

Therapeutic Classification	Prescription (Reference Number)	Provisions
Defecating Therapy	調胃承氣湯(397)	397. 太陽病未解 脈陰陽俱微者 必先振慄 汗出而解. 但陽脈微者 先汗出而解; 若陰脈實者 下之而解. 若欲下之 宜調胃承氣湯. (方見上卷) [098]傷寒
	大柴胡湯(406)	406. 太陽病 過經十餘日 反二三下之 後四五日 柴胡證仍在者 先與小柴胡湯. 嘔不止 心下急 鬱鬱微煩者 為未解也 與大柴胡湯下之則愈. [107]傷寒
	桃仁承氣湯(409)	409. 太陽病不解 熱結膀胱 其人如狂 血自下 下者愈. 其外不解者 尚未可攻 當先解外. 外解已 但少腹急結者 乃可攻之 宜桃核承氣湯. [110]傷寒
	抵當湯/抵當丸(429, 543)	429. 傷寒有熱 少腹滿 應小便不利; 今反利者 為有血也 當下之 可不餘藥 宜抵當丸. [130]傷寒
	大陷胸丸(439),	543. 陽明病 其人善忘者 必有蓄血 所以然者 本有久瘀血 故令善忘 屎雖鞭 大便反易 其色必黑 宜抵當湯下之. [244]傷寒
	大承氣湯(521, 523, 526, 546, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 658, 659, 660),	439. 結胸病 頭項強 如柔痙狀者 下之則和 宜大陷胸丸. [140]傷寒 521. 陽明病 譫語 有潮熱 反不能食者 胃中必有燥屎五六枚也 若能食者 但鞭爾 宜大承氣湯下之. (方見前) [222]傷寒
	大黃硝石湯(571)	523. 陽明病 汗出 譫語者 以有燥屎在胃中 此為實也 須過經乃可下之; 下之若早 語言必亂 以表虛裏實故也 下之宜大承氣湯. (方見前) [224]傷寒
	承氣輩(616)	526. 二陽并病 太陽證罷 但發潮熱 手足皴皴汗出 大便難 而譫語者 下之則愈 宜大承氣湯. (方見前) [227]傷寒
		546. 病人煩熱 汗出則解 又如瘧狀 日晡所發熱者 屬陽明也. 脈實者 宜下之 脈浮大者 宜發汗. 下之與大承氣湯 發汗宜桂枝湯.(方見前) [247]傷寒
		557. 得病二三日 脈弱 無太陽柴胡證 煩躁 心下鞭 至四五日 雖能食 以小承氣湯少少與 微和之 令小安. 至六日與小承氣湯一升. 若不大便六七日 小便少者 雖不大便 但初頭鞭 後必漉 未定成鞭 攻之必漉 須小便利 屎定鞭 乃可攻之 宜大承氣湯. (方見前) [258]傷寒
		558. 傷寒六七日 目中不了了 睛不和 無表裏證 大便難 身微熱者 此為實也 急下之 宜大承氣湯. (方見前) [259]傷寒
		559. 陽明病 發熱 汗多者 急下之 宜大承氣湯. (方見前) [260]傷寒
		560. 發汗 不解 腹滿痛者 急下之 宜大承氣湯. (方見前) [261]傷寒
		561. 腹滿不減 減不足言 當下之 宜大承氣湯. (方見前) [262]傷寒
		562. 陽明少陽合病 必下利 其脈不負者 為順也; 負者 失也. 互相克責 名為負也. 脈滑而數者 有宿食也 當下之 宜大承氣湯. (方見前) [263]傷寒
		658. 少陰病 得之二三日 口燥咽乾者 急下之 宜大承氣湯. [359]傷寒
	659. 少陰病 自利清水 色純青 心下必痛 口乾燥者 可下之 宜大承氣湯. (方見上) [360]傷寒	
	660. 少陰病 六七日 腹脹不大便者 急下之 宜大承氣湯.(方見上) [361]傷寒	
	571. 黃疸 腹滿 小便不利而赤 自汗出 此為表和裏實 當下之 宜大黃硝石湯. [272]傷寒	
	616. 太陰病 有宿食 脈滑而實者 可下之 宜承氣輩 若大便漉者 宜厚朴枳實白朮甘草湯. [317]傷寒	