

APPENDIX 3. The Strongly Inferred Prescriptions by Therapeutic Classification

Therapeutic Classification	Prescription (Reference Number)	Provisions	
Strengthening Therapy	小建中湯 -575(虛勞法), 812(虛勞裏急)	575. 諸黃 小便自利者 當以虛勞法 小建中湯主之. [276]傷寒 812. 虛勞裏急 悸衄 腹中痛 夢失精 四肢酸疼 手足煩熱 咽乾口燥者 小建中湯主之. [11]痺痺虛勞	
	芍藥甘草湯 -329(其脚即伸), 330(以救液)	329. 傷寒 脈浮 自汗出 小便數 心煩 微惡寒 腳攣急 反與桂枝湯欲攻其表 此誤也. 得之便厥 咽中乾 煩躁 吐逆者 作甘草乾薑湯與之 以復其陽. 若厥愈 足溫者 更作芍藥甘草湯與之 其脚即伸. 若胃氣不和 譫語者 少與調胃承氣湯. 若重發汗 復加燒針者 四逆湯主之. [030]傷寒	
	芍藥甘草附子湯 -370(虛故)	330. 問曰 太陽病 其證備 按桂枝法治之 而增劇 厥逆 咽中乾 煩躁 吐逆 譫語 其故何也? 師曰 此陽旦證 不可攻也 寸口脈浮 浮則風 亦為虛 風則生熱 虛則攣急 誤攻其表 則汗出亡陽 汗多則液枯 液枯則筋攣 陽明內結則煩躁譫語 用甘草乾薑以復其陽 芍藥甘草以救液 調胃承氣以止其譫語 此壞病之治 必隨脈證也. [031]傷寒	
	豬膏髮煎 -570(津液枯燥)	370. 發汗 病不解 反惡寒者 虛故也 芍藥甘草附子湯主之. [071]傷寒	
	人參白朮芍藥甘草湯 -611(津液傷)	570. 陽明病 身黃 津液枯燥 色暗不明者 此熱入於血分也. 豬膏髮煎主之.[271]傷寒 611. 太陰病 下利 口渴 脈虛而微數者 此津液傷也 宜人參白朮芍藥甘草湯. [312]傷寒	
	葛根黃連黃芩甘草湯 -334(熱未解)	334. 太陽病 桂枝證 醫反下之 利遂不止 脈促者 熱未解也. 喘而汗出者 葛根黃連黃芩甘草湯主之. [035]傷寒	
	白虎湯 -481(裏有熱), 688(裏有熱)	481. 傷寒 脈浮滑 此以裏有熱 表無寒也 白虎湯主之. [182]傷寒 688. 傷寒 脈滑而厥者 裏有熱也 白虎湯主之. [389]傷寒	
	大黃黃連黃芩瀉心湯 -462(攻痞)	462. 心下痞 按之濡 其脈關上浮大者 大黃黃連黃芩瀉心湯主之. [163]傷寒 671. 傷寒六七日 脈遲 而反與黃芩湯徹其熱 脈遲為寒 今與黃芩湯復除其熱 腹中應冷 今反能食 此名除中 必死. [372]傷寒	
	黃芩湯 -671(徹其熱, 除其熱)		
	Cooling Therapy	桂枝去桂加茯苓白朮湯 -328(小便不利)	328. 太陽病 服桂枝湯 或下之 仍頭項強痛 翕翕發熱 無汗 心下滿 微痛 小便不利者 桂枝去桂加茯苓白朮湯主之. [029]傷寒
		五苓散 -373, 375, 442, 464, 550, 737(小便不利)	373. 太陽病 發汗後 大汗出 胃中乾 煩躁不得眠 欲得飲水 少少與之 令胃氣和則愈. 若脈浮 小便不利 微熱 消渴者 五苓散主之. [074]傷寒 375. 傷寒 汗出而渴 小便不利者 五苓散主之. 不渴者 茯苓甘草湯主之. [076]傷寒
五苓散加茵陳蒿 -574(但利其小便)		442. 太陽病 脈浮而動數 浮則為風 數則為熱 動則為痛 頭痛發熱 微盜汗出 而反惡寒者 表未解也. 醫反下之 動數變遲 膈內拒痛 胃中空虛 客氣動膈 短氣 躁煩 心中懊惱 陽氣內陷 心下因硬 則為結胸 大陷胸湯主之. 若不結胸 但頭汗出 餘處無汗 劑頸而還 小便不利 身必發黃. 五苓散主之. [143]傷寒	
茯苓甘草湯 -375(小便不利), 693(先治水)		464. 本以下之 故心下痞 與瀉心湯. 痞不解 其人渴 而口燥煩 小便不利者 五苓散主之. (方見前) [165]傷寒 550. 太陽病 寸緩 關浮 尺弱 其人發熱汗出 復惡寒 不嘔 但心下痞者 此以醫下之. 如其未下 病人不惡寒而渴者 此轉屬陽明也. 小便數者 大便必硬 不更衣十日 無所苦也. 渴欲飲水者 少少與之 以法救之. 渴而飲水多 小便不利者 宜五苓散. [251]傷寒	
柴胡加龍骨牡蠣湯 -410(小便不利)		737. 消渴 脈浮 有微熱 小便不利者 五苓散主之. [438]傷寒 574. 諸黃家 但利其小便 五苓散加茵陳蒿主之; 假令脈浮 當以汗解者 宜桂枝加黃耆湯. (五苓散見前加茵陳蒿十分同末) [275]傷寒	
豬苓湯 -529(小便不利), 530(復利其小便)		375. 傷寒 汗出而渴 小便不利者 五苓散主之. 不渴者 茯苓甘草湯主之. [076]傷寒 410. 傷寒八九日 下之 胸滿 煩驚 小便不利 譫語 一身盡重 不可轉側 柴胡加龍骨牡蠣湯主之. [111]傷寒	
茵陳蒿湯 -542, 565(小便不利)		529. 陽明病 脈浮 發熱 渴欲飲水 小便不利者 豬苓湯主之. [230]傷寒 530. 陽明病 汗出多而渴者 不可與豬苓湯 以汗多胃中燥 豬苓湯復利其小便故也. [231]傷寒 693. 傷寒 厥而心下悸者 宜先治水 當服茯苓甘草湯 却治其厥. 不爾 水漬入胃 必作利也. [394]傷寒	
		410. 傷寒八九日 下之 胸滿 煩驚 小便不利 譫語 一身盡重 不可轉側 柴胡加龍骨牡蠣湯主之. [111]傷寒	
		529. 陽明病 脈浮 發熱 渴欲飲水 小便不利者 豬苓湯主之. [230]傷寒	
		530. 陽明病 汗出多而渴者 不可與豬苓湯 以汗多胃中燥 豬苓湯復利其小便故也. [231]傷寒	
		542. 陽明病 發熱汗出者 此為熱越 不能發黃也 但頭汗出 身無汗 劑頸而還 小便不利 渴引水漿者 此為瘧熱在裏 身必發黃 茵陳蒿湯主之. [243]傷寒 565. 傷寒七八日 身黃如橘子色 小便不利 腹微滿者 茵陳蒿湯主之. (方見前) [266]傷寒	